



VIOLENCIA DE GÉNERO

PRÁCTICAS DE VIOLENCIA - LA MUTILACIÓN FEMENINA

Índice

MUTILACIÓN FEMENINA	3
¿Dónde ocurre?.....	3
Grupos de riesgo	3
Factores culturales y sociales.....	3
Efectos a corto y largo plazo	4

MUTILACIÓN FEMENINA

La mutilación genital femenina es definida por la OMS como "todos los procedimientos que, de forma intencional y por **motivos no médicos**, alteran o lesionan los **órganos genitales femeninos**". Usualmente se realiza a niñas entre **0 y 14 años** y, ocasionalmente, a mujeres adultas.

¿Dónde ocurre?

La mutilación genital femenina se concentra principalmente en **alrededor de 30 países de África y Oriente Medio**, también se practica en algunos países de **Asia y América Latina** y entre las comunidades que proceden de estas regiones.

Aunque es ilegal en la UE, se estima que alrededor de 600.000 mujeres que viven en Europa han sido sometidas a la mutilación genital femenina.

Grupos de riesgo

La mutilación genital femenina se practica principalmente a **las niñas**, en algún momento entre la **lactancia y la adolescencia**, y en algunos casos a mujeres adultas. Según la información obtenida en **30 países** donde se realiza esta práctica hay **más de 300 millones de niñas y mujeres** vivas en la actualidad la han sufrido, y se calcula que más de 4 millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a ella cada año.

Factores culturales y sociales

Los **motivos** por los que se practica la mutilación genital femenina son muy diferentes en función de la región y la época, y responden a una mezcla de factores socioculturales en las familias o las comunidades.

- En algunos lugares se ve como una **norma u obligación social**, por la presión de la sociedad se sigue realizando.
- Se ve como una parte necesaria de la **crianza** de la niña y una forma de prepararla para la vida adulta y el matrimonio.
- Reprimir la **sexualidad** de la mujer.
- Hay quienes creen que hay **motivos religiosos** que apoyan esta práctica.

Efectos a corto y largo plazo

- Dolor severo.
- Sangrado
- Problemas psicológicos.
- Hinchazón del tejido genital.
- Infecciones urinarias.
- Complicaciones en el parto.
- Muerte debido al sangrado severo.